



حكومة فلسطين

## دائرة الزراعة ومصائد الاسماك

الاحاديث الزراعية المذاعة على المزارعين خلال شهر آب سنة ١٩٣٨

( ما عدا الاحاديث المنشورة في الملحق الزراعي )

الصفحة

٣

الاطباء الشائعة في زراعة الفواكه

٨

أعداء النحل ومكافحتها

## الاطء الشائعة في زراعة الفواكه

أيها المزارعون الكرام أسعد الله مساءكم.

نخصص حديثنا في هذا المساء للتحدث عن بعض الاطء الشائعة في زراعة الفواكه ولكن ارجوكم الا تطلبوا منى أن اعدد لكم هذه الاطء التى يأتىها مزارعو الفواكه في فلسطين لان هذه الليلة بطولها لا تكفى لذلك. ولكنى سأتحدث فقط عن بعض أخطاء أرى أن التحدث عنها لازم في هذا الوقت

توجد أخطاء كثيرة في التقليم الصيفى ولذلك فانى سأتحدث قبل كل شىء عن هذه الاطء وأرى أن الواجب يقضى على أن أشرح لكم كيف يجب أن يكون التقليم الصيفى

أظن أنكم تعلمون أن هنالك جدالا كبيرا بين مزارعى الفواكه حول منفعة التقليم الصيفى وعدم منفعته. ويظهر لى أن منشأ هذين الرايين المختلفين هو عدم الاختبار الكافي الناتج عن الملاحظة السطحية والتقليم في غير أوانه. ان الغرض الذى نرمى اليه عند التقليم هو أن نجعل الاشجار واطئة الاغصان متناسبة الجذوع كى تكون في حالة جيدة تمكنها من النمو والانتاج المنتظم الكثير

والآن لنبحث في مسألة أشجار الفواكه الصغيرة. ولنفرض أنها قلمت بعد زراعتها ولم يترك عليها الا الاغصان الرئيسية والاصلية فتموها الشديد يبتدىء في الربيع من عدد من البراعم التى تكون على الاغصان الرئيسية. واذا كانت هذه الاشجار من ذات النوى (البزر) كالبرقوق والخوخ والمشمش فان طلقات قوية تخرج منها في الصيف. وتستمر في النمو بعد ذلك أيضا ولكن بصورة أقل في السنين التالية. فجميع الطلوق الصيفية تحتاج الى عناية وذلك لجعل شكل الشجرة منتظما ولتتمكن الحيوية من أن تدب في جميع أغصان الشجرة فتثمر كلها على السواء. ويمكننا الحصول على ذلك بواسطة التقليم والتخفيف الصيفى. وفيما يلى أهم عمليات تقليم الاشجار الصغيرة في الصيف—تخفيف الطلوق عندما تكون نامية ومتلاصقة جدا ثم قطع الطلوق الزائدة التى تكون غير منتظمة. وارجاع الطلوق القوية

لاملاء الفراغ الموجود في الشجرة. وإذا تم ذلك في الوقت المطلوب تتفرغ غصون الشجرة وتكون أجزاء ثينة من جسمها. ثم عندما تريدون قطع غصن من الاغصان فيجب أن يكون ذلك في الصيف الباكر قبل أن يتص كثيرا من غذاء الشجرة. ومن اخطاء المزارعين الشائعة أنهم يتركون مثل هذه الطلوق على الشجرة حتى منتصف الصيف فيجدونها عند ذلك غليظة وثقيلة على حساب الاغصان المنتظمة والاكثر فائدة منها. يجب أن تعلموا أيضا أن قطع الاغصان الكبيرة أثناء الصيف يؤثر تأثيرا سيئا على الشجرة بأسرها ويؤثر أيضا على نموها في النصف الآخر من فصل الصيف. والخطأ الثاني الشائع هو تركيز الطلوق الصغيرة التي تكون قد قست ظنا بأنها ستعود فتنمو وتخرج أغصانا أخرى في السنة نفسها. وهذه الفكرة خاطئة جدا لان الطلوق اللينة الخضراء هي التي وحدها تتفرع منها وتصبح غصونا تواصل نموها بعد أن تنقطع البراعم الزائدة. وعندما تبلغ الطلوق كامل نموها فالنتيجة الواحدة من التقليم عند ذلك هي ايقاف نموها واخراج البراعم التي تثر الفواكه في الفصل التالي. ولاشرح لكم شروط التقليم الاساسية التي ذكرتها لكم أقدم لكم هذا المثل :—

لنأخذ شجرة خوخ صغيرة من نوع «سانتا روزا» أو «ويكسن» ولنفرض أن هذه الشجرة قلمت في الشتاء فأصبحت مؤلفة من ثلاثة أغصان رئيسية متساوية القوة فأخرج الغصنان الشمالى والجنوبى طلوفا كثيرة بينما لم يخرج الغصن الغربى شيئا. ثم أخرجت الشجرة أيضا طلوفا جديدة من الجذع الرئيسى تحت الاغصان ومنها طلقة قوية جدا ممتدة الى فرق ونحو الغرب. فكيف نقلم مثل هذه الشجرة في الصيف ؟ يجب أن نخفف الطلقات التي تكون على الغصنين الشمالى والجنوبى ونترك الطلوق غير المتشابكة والتي من شأنها أن تكون عاملا على تجميل شكل الشجرة وجعلها متوازية الاغصان. أما الطلوق التي تكون على الجذع الرئيسى فيجب أن تقطع ما عدا الطلق الغربى القوى اذ يجب أن يترك ليحل في المستقبل محل الغصن الغربى الضعيف وهذا الطلق يجب أن يقطع الى ما فوق آخر الغصنين الشمالى والجنوبى ليتمكن من أن ينمو فيما بعد ويملا الفراغ الذى أوجده الغصن الضعيف في رأس الشجرة. ثم تذكروا من فضلكم أنكم يجب عليكم أن تقوموا بجميع هذه العمليات

خلال شهر أيار أو حزيران على الأكثر أعنى قبل أن تصبح الطلوق الجديدة قاسية. أما اذا كانت أشجار الفواكه قديمة فتكون طلوقتها عادة أقل من طلوق الاشجار الصغيرة ولذلك تقلم في فصل الشتاء. أما الغاية الرئيسية من تقليم الاشجار الحاملة في الصيف فهو إيقاف نمو الغصنين القويين الى فوق والعمل على إيجاد عدد كبير من الاغصان التي تحمل الثمر. ويمكننا تحقيق هاتين الغايتين بتشذيب الطلوق بعد أن تصبح صلبة أى في شهر تموز اذا كانت الاشجار من ذات النوى وفي شهر آب اذا كانت من أشجار التفاح أو الاجاص (انجاص). ومن الملاحظ جيدا أن الاغصان التي تقلم تقليا متأخرا (وخرى) لا تواصل النمو ولكنها تصبح أغصانا تحمل ثمرا. والآن أريد أن أقول لكم كلمة عن عملية قطع فسائل التركيب من الاشجار أثناء أشهر الصيف. أظن أنكم قد فهمتم مما قلت لكم أن فسائل التركيب يجب أن تقطع فقط بعد أن تصبح الطلوق قاسية وبالغة كمال النمو. ويجب أن لا تقطعوها في أوائل الصيف لان قطعها في ذلك الوقت يكون مضرًا بالاشجار ويضعف نموها ويقلل ثمرها. ثم أريد أن أجمل لكم ما قلت لكم في هذا الموضوع فأقول يجب عليكم أن تعلموا دائما أولا — ان تقليم الطلوق الصغيرة اللينة خلال مدة نموها الاولى يفسح المجال لنمو الاجزاء الاخرى فيما بعد واخراج طلاقات متأخرة أخرى.

ثانياً — ان تقليم الاغصان التي قاربت أن تصبح كاملة النمو صلبة العود أى الاغصان التي وقف نموها ولكنها لا تزال لينة خضراء جدا يؤثر على الشجرة كلها تأثيرا سيئا جدا. ولذلك يجب ألا تجروا مثل هذا التقليم الا اذا أردتم أن تضعفوا شجرة ما كشجرة أجاص قوية جدا

ثالثاً — ان تقليم الطلوق الصلبة أو الكاملة النمو لا يجعل الشجرة تخرج بعد ذلك طلوقة جديدة خلال فصل الصيف نفسه بل بالعكس يوقف النمو ويجعل الاغصان تحمل ثمرا.

رابعا — اعلموا دائما أن التقليم الصيفي هو تكملة لتقليم الشتوى. وانه يجب عليكم أن تقوموا بمعظم التقليم ابان رقاد الشجرة في الشتاء على أن يكون التقليم الصيفي مقصورا على اجراء بعض التصليحات البسيطة والتخفيف فقط

والآن دعونا ننتقل الى التحدث عن خطأ آخر معروف في زراعة الفواكه الا وهو تخفيف فواكهكم ومع أنه قد فات أوان تخفيف الاشجار فقد حان الاوان لتذهبوا الى بسايتنكم وتنظروا النتيجة السيئة الناشئة عن ترك جميع الفواكه على بعض الاشجار. انظروا الى شجرة من شجر الحوخ المسمى (كلسى) أو تفاح (روم بيوتى) أو غيره من الاشجار التى تحمل فواكه كثيرة جدا فانكم ترونها منحنية تحت ثقل فواكهها. وانكم ترون عادة كثيرا من الاغصان متكسرة لكثرة ما تحمل من الفواكه واذا خصتم هذه الفواكه وجدتم أنها من صنف أصغر وأضعف من فواكه الاشجار التى تحمل أقل منها. ووجدتم أيضا أن نسبة الفواكه التى حرقها الشمس كثيرة وذلك بسبب قلة أوراق الشجرة التى تغطيها مما يجعل كل حيوية الاشجار وقفا على محصول الفاكهة الكثيرة. ان أصحاب مثل هذه الاشجار لا يدركون أنهم بسماحهم لاشجارهم أن تحمل كثيرا من الفواكه يجلبون المتاعب لانفسهم ويعملون على تقصير أعمار بسايتنهم بأيديهم

لذلك يجب أن تعلموا أيها الاخوان المزارعون ما يلى :—

أولا — أن كثيرا من أنواع الاشجار قابلة لان تحمل حملا كبيرا من الفواكه ولكنها تفقد قواها اذا تركت جميع الفواكه عليها وسمح لها أن تبلغ تمام نضجها. وبذلك تقصر أعمار الاشجار وتصبح لا تحمل في كل سنة كالسابق

ثانياً — ان الاشجار التى تحمل من الفواكه أكثر من اللازم تصبح أقل مقاومة للحشرات والامراض وتصبح الاشجار المنهكة القوى فرائس للقادوح والحشرات الكثيرة الاخرى

ثالثاً — أعلموا أنه بزيادة محصول الفواكه في البلاد لا يستدر المزارعون فوائد كبيرة من فواكههم ذات النوع الضعيف والحجم الصغير. ولذلك يجب عليكم أن تعملوا ما استطعتم على انتاج صنف ممتاز من الفاكهة. وتوصلا الى ذلك يجب عليكم أن تخففوا الفواكه التى على أشجاركم بانتظام وكلما بكرتم في هذه العملية كان ذلك أحسن لكم. لا تخافوا من تقليل غلة أشجار الحوخ المعروفة باسم «كلسى» الى نصفها مثلا لان الاسعار الجيدة التى

تحصلون عليها من بيع الاثمار الباقية والانتاج الطويل والمنتظم ستعوض عليكم الكمية التي فقدتموها بتخفيف الثمر

هذا واذا كنتم تريدون تفصيلات عن عملية تخفيف الفاكهة فأكتبوا الى دائرة الزراعة فترسل اليكم كراسة صغيرة تبحث في ذلك الموضوع. وقبل أن أنهى حديثي عن هذه المسألة أود أن أذكر لكم طريقة معروفة وهى تخفيف الفاكهة قبل نضوجها واستعمال هذه الفاكهة للطبخ. وليكون التخفيف ذا فائدة يجب أن تقوموا به قبل أن تكبر الفاكهة الصغيرة وتأخذ من الشجرة قسما كبيرا من الغذاء. ولذلك فأحسن وقت لتخفيف الفاكهة هو أن يكون بعد أن تعقد بقليل ويتوقف تساقط النوار. ويجب أن تتذكروا دائما أن القسم الاكبر من المواد المعدنية والعضوية في الفاكهة لازمة لتكون البذر أو النوى وانكم اذا أردتم أن يكون التخفيف مفيدا فيجب أن تقوموا به قبل أن تتكون البزور لا بعد ذلك. لقد كان باستطاعتي أن أذكر أكثر مما ذكرت لكم من الاخطاء الشائعة فقد يكون كثيرون منكم قد لاحظوا أن سقى الاشجار المتأخر كثيرا في فصل الخريف قد يبق الاشجار التي تتساقط أوراقها نامية خلال فصل الشتاء كله وبذلك تضعف الاشجار كثيرا لعدم راحتها التامة خلال مدة رقودها. وبعض المزارعين يهتمون حماية سيقان أشجارهم من حر الشمس فلا يرشونها بالكلس. فيكون اهمالهم هذا سببا لشلل كثير من أشجار الاجاص والتفاح وموتها. وان عندي نقاطا كثيرة هامة أود أن ألفت نظركم اليها ولكنى أخشى أن يكون قد انتهى الوقت المحدد لى في هذا المساء

واخيرا أود أن ألفت انتباه اخوانى المزارعين الى أن حديثنا التالى الذى سنذيعه في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء القادم الواقع في ٢٣ آب سيكون عن «اعداء النحل ومكافحتها» والى اللقاء



## اعداء النحل ومكافحتها

لا شك في انكم تعلمون أن النحل يستطيع تدبير أمره بنفسه. ويقضى على العدل أن أقول أن النحل لا يعتمد في معيشته على مربيه بصورة من الصور ولا يتطلب منه أية مساعدة كما تتطلب الحيوانات الاليفة. انه يبحث عن طعامه وشرابه ليس ليومه فقط ولكن ليخزن منه لوقت الحاجة وهو يبنى خلاياه ويؤثثها بأثاث مريح ويضع فيها اسرة (تخوته) لاطفاله وخوابى لطعامه. وهو يدبر شؤون منزله بنفسه ويحافظ على نظافته نظافة تامة ويصلح كل ما يحدث فيه من خذل ويحفظه دافئا في الشتاء وباردا في الصيف الخ... ويمكنني أن أوكد لكم أن النحل لو كان مخيرا في أمره لاستغنى بكل سرور عن جميع ما يقدم له مربيه من الخدمات. وبذلك يصح له أن يعكس المثل القديم القائل «لا لسعك ولا عسلك» فيقول لمربيه «لا مساعدتك ولا عسلي»

وليس النحل مشهورا بأنه شغل ودقيق النظام فقط ولكنه محارب مدهش أيضا وله أسلحة مرهفة يستعملها لمحاربة أعدائه. فكل نحلة مسلحة بسلاح ممتاز هو «اللسع» يرتجف له كل من يقصد مهاجمته وبالرغم من أن النحل يستعمل هذا السلاح للدفاع عن حياته فانه مستعد دائما لتضحية نفسه في سبيل المحافظة على خليته. ولكن لسوء الحظ توجد للنحل أعداء لا تزال انشط منه. فاذا لم يبادر مربى النحل الى مساعدته فانه يصبح في خطر الانهزام أمام العدو. وأعداء النحل حيوانات وحشرات مختلفة الانواع ومنها الطيور والسحالي والديبة وبنات آوى والحشرات كالديابير والعث. وانى أقصد أن أخصص حديثى في هذه الليلة بالتحدث عن هذين العدوين الآخرين لانهما أكثر من جميع أعداء النحل أهمية في هذه البلاد. وأود أيضا أن ألفت انتباهكم الى أنه عندما يأتى الوقت الذى فيه يهدد هذان العدوان النحل بأفطع الاخطار يجب عليكم أن تستعملوا جميع وسائل الدفاع التى سأشرحها لكم الآن وان تكونوا مستعدين لذلك أتم الاستعداد قبل أن يبتدىء موسم مهاجمة هذين العدوين. تذكروا من فضلكم أن هذين العدوين يلحقان ضررا عظيما بخلايا نحلكم ونحل جيرانكم ولذلك فان أضمن وأحسن وسيلة لمكافحته هو أن تشاركوا اشتراكا تاما مع جيرانكم في وضع خطط الدفاع المشتركة

وأود قبل كل شيء أن أصف لكم تاريخ وعوائد هاتين الحشرتين باختصار وذلك لأننا كلما عرفنا الشيء الكثير عن أعدائنا كلما استطعنا أن نقلل صعوبة محاربتها. فلنتكلم اذن عن الدبور أولاً — الدبور حشرة حمراء بنية وجهها أصفر وبطنها ذو بقع صفراء وهى من نفس فصيلة النحل ولكن يمكننا أن نميزها عن النحل لاول لحظة لان لونها يكون أغمق من لون النحل واكبر حجما منه وأسرع طيرانا. لا نرى في الشتاء دبابير طائرة لان البرد يقتلها. ولا يبقى منها سوى ملكات الدبابير التى تنجح عادة في إيجاد مأوى لها في شقوق البنيات وخروجها وما شاكل ذلك. أما في الربيع من نيسان الى حزيران فانكم ترون الدبابير طائرة ولا سيما بالقرب من الامكنة التى يكون فيها ماء وهذه الدبابير هى ملكات الدبابير التى ذكرتها لكم الآن والتى تكون قد خرجت للبحث عن أمكنة موافقة لبيوتها التى تريد أن تبنيها من جديد اما في الارض أو في أحجار الفئران أو الحلدة المهجورة أو بين الاحجار أو شقوق الحيطان والبنيات حيث تبني خليتها وتضع بيضها وتربي صغارها التى عندما تكبر تساعد في توسيع الخلايا وتربية الصغار الاخرى. وهكذا فان كل ملكة من ملكات الدبابير تربي الوفا من الدبابير في فصل الصيف. أما في شهرى حزيران وتموز فانا لا نرى الا قليلا من الدبابير وذلك لان الملكات تكون مشغولة في بناء خلاياها وتكون الدبابير الصغيرة غير قادرة على الخروج بعد. أما فصل مهاجمة الدبابير للنحل فيبتدىء في شهر آب ويمتد الى تشرين الثانى. وأما طريقة مهاجمتها للنحل فهى أن تمسكه وهو على الازهار وبالقرب من أمكنة الشرب وخصوصا عند مداخل خلاياه. ولذلك فاذا لم تبعد الدبابير عن الخلايا بالوسائل اللازمة فمن المؤكد أنها تستطيع أن تخترق خط الدفاع الذى يكونه النحل فتنهيه وتخرب دياره تماما. ويجب عليكم أن تستعملوا عدة وسائل للدفاع في وقت واحد لان استعمال طريقة واحدة فقط لا يؤدى الى النجاح المطلوب

وفي أوائل شهر آب يجب أن تغلقوا جميع مداخل خلايا النحل بوسيلة تمنع دخول الدبابير وذلك بان توضع عليها شبكة ضيقة من الاسلاك تمكن النحل من المرور فيها دون الدبابير. ويجب أن توضع على مدخل الخلية ملكة من ملكات النحل كحاجبة لذلك الغرض. ويجب أن تفتش الخلايا جيدا وأن تغلق جميع الشقوق والخروقات التى قد تمكن الدبابير من المرور الى الخلية



ثانياً — يجب أن توضع طبقة فارغة تحت مكان التفقيس في الخلايا القوية جدا وذلك لمنع النحل من التجمهر عند مدخل الخلية.

ثالثاً — ضعوا فخاخا للدبابير في المنحلة وحواليها. وتصنع هذه الفخاخ بالطريقة التالية :—

خذوا تنكة كاز فارغة واخلعوا غطاءها كله واجعلوا في كل جانب من جوانبها الاربعة خرقا أو خرقين بمقدار ثمانية سنتمترات مربعة. ثم أدخلوا في كل خرق شبكة مشربكة من الاسلاك تجعلونها على صورة كوز. ثم ادفعوا بها داخل التنكة واحموا رأسها بجوانب خروق التنكة. ومن المهم طبعاً أن تجعلوا في أسفلها خرقاً أو فتحة مقدارها سنتمتر مربع وذلك لتتمكن الدبابير من الدخول منها ويقفل عليها باب الخروج. والخطوة الثانية هي أن تضعوا في التنكة طعاماً من العسل أو اللحم أو الحل أو الفاكهة الفاسدة التي تستميل الدبابير ثم بعد ذلك تغلقون فتحة التنكة بشبكة محكمة من الاسلاك. ولكي تقتلوا الدبابير التي تكون في الفخ ضعوا الفخ برمته في برميل ماء واتركوه هنالك تحت الماء مدة خمس عشرة دقيقة حتى تموت كل الدبابير وبعد ذلك نظفوا الفخ وضعوا فيه طعاماً جديداً الخ..

رابعا — عندما تجدون كثيراً من الدبابير حول الخلية فيمكنكم أن تقتلوا كلها بواسطة قطع معلقة من اللحم في أماكن مختلفة. وعندما تترام الدبابير على قطع اللحم فيغطيها تماماً يجب أن تأخذوا آنية ملاءى بالماء الحار وترفعوها كي تتمكن من أن تغطس قطعة اللحم برمتها في الماء الساخن دون أن تحركوا قطعة اللحم نفسها وبذلك تسقط الدبابير في الماء الساخن وتموت. وبعد ذلك تستطيعون أن تستعملوا قطع اللحم نفسها لمثل هذه العملية

خامساً — ان أحسن طريقة فعالة لتخريب خلايا الدبابير هي استعمال مسحوق «السيانو غاز» فتضعون كمية قليلة من هذا المسحوق داخل مدخل خلية الدبابير فيقتل الموجود منها في الخلية والدبابير التي ستعود إليها. ويمكنكم أن تحصلوا على مسحوق السيانو غاز هذا بطلب من مأموري البيطرة بشرط أن يكون استعماله لمصلحة مربى النحل وأصحاب البساتين. وأخيراً يجب ألا تنسوا أن كل ملكة تلد آلافاً من الدبابير في فصل التفقيس وانكم بقتلكم ملكة

واحدة من هذه الملكات تقللون آلافا من الدبابير التي تظهر في فصل الخريف. وكما قلت لكم قبل قليل تظهر خلال شهرى نيسان وأيار كثير من ملكات الدبابير حول الخلايا لا سيما عند الامكنة التي فيها ماء كالبراميل والاحواض وما شاكلها. ويسهل قتلها في ذلك الوقت بضربها بالعصا ودوسها بالارجل. ويمكنكم أن تقبضوا عليها بشبكة وتقتلوها

أما العدو الثانى الشديد الخطر على اقتصاديات مربى النحل فهو كما قلت لكم سابقا عث الشمع. وهذا العث يتراوح طوله ما بين سنتيمتر ونصف الى سنتيمترين . وهو رمادى اللون وسريع الحركة يمكنكم أن تروه في الايام التي يكثر فيها الضباب وعند غروب الشمس بالقرب من خلايا النحل. ان العث نفسه لا يلحق ضررا مباشرا بخلايا النحل ولكن دوده الصغير الذى يخرج من البيض هو الذى يسبب هذا الضرر. ونظرا للمناخ بلادنا المعتدل فالعث يفسد بسرعة هائلة. فانثى العث تبيض خمس أو ست مرات في السنة ومن بيضها يخرج الدود الصغير الذى ذكرناه. أما المدة التي يتطلبها هذا الدود ليصبح عثا كامل النمو فتتراوح ما بين ١٤—٢٠ يوما. وخلال هذه المدة يأكل شمع النحل وصغاره ولقاحه وحتى خشب براوين الخلايا. وبعد ذلك يكتمل نموها وتصبح عثا يبيض ويعمل نسله ما عمل هو الخ.. والدود يثقب أقراص النحل ويغطيها بالانسجة والشرانق واذا ترك له الجبل على الغارب فقد يخرب آلافا من الاقراص في أسابيع قلائل. ويظهر أن النحل يدرك الخطر العظيم الذى يهدده من جراء دخول العث الى خليته اذ لا يصده عن ذلك شيء الا اذا كانت الخلية ضعيفة أو لا ملكة لها. اذن يجب أن تدركوا الآن أن الواجب يقضى عليكم تجنبنا خراب خلايا نحلكم أن تجعلوها كلها قوية ترأسها ملكات جيدة وأن لا تتركوا الاقراص القديمة أو الاقراص غير المستعملة في جوار الخلية دون أن تحافظوا عليها. ويجب عليكم أن تبعدوا عن الخلية جميع الاقراص التي لا يستعملها النحل وأن تضعوها مع غيرها من الاقراص الفارغة في طبقات فارغة موضوعة فوق بعضها البعض وان تضعوا طبقة فارغة فوق الجميع وذلك كي تضعوا فيها صحن فخار يحتوى على نار من الفحم تضعون فوقها قبضة من مسحوق الكبريت. ثم يجب أن تضعوا فوقها كيسا فارغا مبلولا. أما دخان الكبريت فينزل ويغطي الطبقات السفلى. لكونه أخف من الهواء. وهنا يجب أن الفت انتباهكم الى أن هذا الدخان سام قاتل

للث ودوده الصغير الذى قد يفسد خلال تلك المدة. ومن الموافق بعد ذلك أن تقوموا بعملية تبخير هذه الطبقات وتبخير الاقراص مرة في كل شهر

وأظن أن بعض مستمعينا قد يعجبون اذا قلت لهم أن قيمة أقراص النحل التى يتلفها العث سنويا في خلايا فلسطين تبلغ ٥٠٠ جنيه

وأظن أنكم تعلمون أن الخسارة المباشرة ليست ناشئة عن تخريب الاقراص فقط ولكن هنالك خسارة غير مباشرة في محصول العسل بسبب قلة هذه الاقراص عندما تكون الحاجة اليها شديدة

ويمكن أن نعتبر هذه الخسارة أكثر من الاولى ونقدرها بالوف الجنيهات في كل سنة

وانى متأكد من أنكم ستوافقون معى على أنه من الصعب أن نوضح النقاط الفنية في حديث يذاع بالراديو وقد لا أكون مخطئا اذا قلت أن بعضكم لم يفهموا بعض وسائل المكافحة التى ذكرتها لكم تماما. وانى لا أريد أن تظنوا غير فاهمين لها ولذلك فاذا كنتم تطلبون معلومات فنية أوفى عن محاربة الدبابير والعث فتستطيعون أن توجهوا طلباتكم رأسا الى مأمور الطيور الداجنة والنحل التابع لمصلحة البيطرة في قضائكم وانى متأكد من أنه سيشرح لكم المسائل المختلفة التى ذكرتها لكم في حديث الليلة بكل سرور

ثم لا تنسوا من فضلكم أن تستمعوا الى حديثنا التالى يوم الثلاثاء القادم الساعة السابعة مساء وعنوانه «خلاصة أعمال مدرسة خضورى الزراعية بطولكرم خلال المدة المبتدئة من تشرين الاول سنة ١٩٣٧ الى تموز سنة ١٩٣٨» والى اللقاء